



## 新型コロナワクチン接種

# Q&A

知っておきたい新型コロナワクチン接種

厚生労働省ホームページから抜粋  
(令和3年6月29日更新分より)

Q ワクチンは必ず接種しないといけないの?

A ワクチン接種は強制ではありません。あくまでも、本人が納得した上で接種を判断してもらうことになります。

今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するもので、接種に協力してほしいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定は、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。

第2回目となる「新型コロナワクチン接種Q&A」のコーナー。町内で65歳以上の高齢者へのワクチン接種が町内で進んでいる中で、64歳以下の高齢者の接種の準備も進んでいます。

ワクチン接種に関する報道により、さまざまな情報が行き交っています。今号ではみなさんに知ってほしい情報をお伝えしていきます。

隔で2回接種します。最も高い発症予防効果が得られるのは、2回目を接種してから7日程度経つてからです。

体内にある程度の抗体ができるまでに1~2週間程度かかるため、1回目の接種後から2週間程度は、ワクチンを受けていないかたと同じくらいの頻度で発症してしまったことが論文などでも報告されています。

ワクチンを2回接種した場合の有効率は約95%と報告されており、100回の発症予防効果が得られるわけではありません。

ワクチンを2回接種した場合の有効率は約95%と報告されています。

Q ワクチンを接種することによる効果が確認されています。

A 次に該当するかたは、ワクチンを接種することができるないのはどんな人?

クチンを接種することはできません。自身が当時はまると思われるかたは、ワクチンを接種しても良いか、かかりつけ医に相談ください。

・重い急性疾患にかかることがあります。

Q 未成年者であっても、16歳以上のかたについては、親の同意書が必要となります。署名がなければ、ワクチン接種は受けられません。

Q 接種会場には、接種後の体調のことを考えて、必ず保護者同伴で来るようにしてください。

接種会場には、接種後の体調のことを考えて、必ず保護者同伴で来るようにしてください。

A 未成年者であっても、16歳

の? 接種会場に来ても接種できるの?

Q ワクチンを接種することで

・未成年者であっても、16歳以上のかたについては、親の同意書が必要ありません。

Q お問い合わせ窓口には、接種会場には、接種後の体調のことを考えて、必ず保護者同伴で来るようにしてください。

Q 未成年者であっても、16歳以上のかたについては、親の同意書が必要となります。署名がなければ、ワクチン接種は受けられません。

Q 未成年者であっても、16歳以上のかたについては、親の同意書が必要となります。署名がなければ、ワクチン接種は受けられません。

1~10%	10~50%	50%以上	発現割合	症状
吐き気、嘔吐	筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ	接種部位の痛み、疲労、頭痛	コミナティ (ファイザー社)	Q 嘔吐 A 筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ
接種後7日以降の接種部位の痛みなど	関節痛、悪寒、吐き気・嘔吐、リンパ節腫、発熱、接種部位の腫れ、発赤・紅斑	接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛	モデルナ (武田/モデルナ社)	Q 吐き気、嘔吐 A 関節痛、悪寒、吐き気・嘔吐、リンパ節腫、発熱、接種部位の腫れ、発赤・紅斑

Q ワクチン接種後、熱が出たときはどうすればいいの?	A 発熱は接種後2日以内に起こることが多く、必要がより出やすくなります。	Q ワクチン接種後、熱が出たときはどうすればいいの?	A 発熱は接種後2日以内に起こることが多く、必要な場合は解熱鎮痛剤を服用するなどして、様子をみることになります。
----------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

Q ワクチン接種後、熱が出たときどうすればいいの?	A 発熱は接種後2日以内に起こることが多く、必要がより出やすくなります。	Q ワクチン接種後、熱が出たときどうすればいいの?	A 発熱は接種後2日以内に起こることが多く、必要な場合は解熱鎮痛剤を服用するなどして、様子をみることになります。
---------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--

Q ワクチン接種後、熱が出たときどうすればいいの?	A 発熱は接種後2日以内に起こることが多く、必要がより出やすくなります。	Q ワクチン接種後、熱が出たときどうすればいいの?	A 発熱は接種後2日以内に起こることが多く、必要な場合は解熱鎮痛剤を服用するなどして、様子をみることになります。
---------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--



**厚生労働省**  
Ministry of Health, Labour and Welfare

ワクチン接種 Q&A  
検索  
こちらのQRコードからもアクセスできます。

新型コロナワクチンコールセンター  
受付時間 9時~21時(土日・祝日も実施)  
☎ 0120-761770[フリーダイヤル]