



サツマイモの害虫被害が拡大

大隅地域のサツマイモほ場で、病害虫のムツスジアシナガゾウムシがゾウムシが発生し、食害による被害が拡大しています。

気温が高くなる時期は、ムツスジアシナガゾウムシが活発になるため、ほ場をよく見回り、早期発見・早期防除に努めましょう。

問い合わせ先

役場耕地林務課林務係
☎(86) 1159「直通」



ムツスジアシナガゾウムシ

表 サツマイモ栽培でのムツスジアシナガゾウムシに使用可能な農薬

商品名	希釈倍数	使用時期	使用回数
コテツフロアブル	2000	収穫前日まで	2回以内
スミチオン乳剤	1000	収穫7日前まで	5回以内
グレーシア乳剤	2000～3000	収穫7日前まで	2回以内
ベネビア OD*	4000	収穫7日前まで	3回以内

※令和8年5月26日付鹿児島県病害虫防除所 病害無視発生予察注意報第1号による

○ムツスジアシナガゾウムシの特徴
・成虫は、つるや葉柄を摂食し、食害を受けた葉は折れて垂れ下がる

・幼虫は、つるの中で発育し、さなぎを経て羽化し、脱出孔からつるの外へ出る

○ムツスジアシナガゾウムシの防除対策
7月～8月頃が防除適期となります。表に掲載した農薬を使用し、使用方法を遵守するとともに、農薬散布時は、周辺の作物へ飛散しないように注意してください。



食害を受けた株



幼虫が寄生し、膨らんだ茎

ごみの袋をしっかりと結びましょう

燃やせるごみの出し方についてお願ひです。

ごみ袋の口がきちんと結ばれていないまま出されていることが見受けられます。特に、3月から販売を開始した新デザインの新指定ごみ袋は、一カ所だけ結んだ状態では出されると中からごみが飛び出る可

能性があり、収集作業に支障をきたします。

ごみ袋の口は十文字に結んで出してください。

問い合わせ先

役場介護環境課環境衛生係
☎(86) 1153「直通」



良い例 (口の袋を十文字に結んでいる)



悪い例 (一カ所だけ結んだ状態)